

Hacer el CAMBIO a RINVOQ

Si ha probado con 1 bloqueante del TNF como HUMIRA® o ENBREL® y aún tiene síntomas después de 3 meses, puede que sea el momento de tomar un medicamento distinto. RINVOQ funciona de forma diferente.

RINVOQ es un inhibidor de las cinasas Jano (JAK, por sus siglas en inglés) que ayuda a detener el ataque de las APs a las células sanas.

ENBREL® (etanercept) es una marca comercial registrada de Immunex Corporation en EE. UU.

Logre

UN ALIVIO RÁPIDO

En un estudio clínico, RINVOQ alivió el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones propios de la APs en algunas personas en tan solo **2 semanas**.

La mayoría de las personas que tomaron RINVOQ sintieron un alivio significativo a las **12 semanas**.

Resultados comprobados

En estudios clínicos para la APs, se ha demostrado que RINVOQ puede lograr lo siguiente:

- **Aliviar la inflamación y la sensibilidad** en lugares como los dedos de las manos, los codos y los dedos de los pies
- **Detener el daño irreversible en las articulaciones** para evitar que siga progresando
- **Reducir considerablemente el cansancio por la APs**
- **Dejar la piel notablemente más despejada** en las personas con placas cutáneas causadas por la APs*

* RINVOQ no está aprobado para tratar la psoriasis en placas.

Con RINVOQ, puede superar mucho más que solo el dolor articular. También puede lograr una **Actividad Mínima de la Enfermedad**, lo que significa menos dolor articular, hinchazón, rigidez y síntomas de la piel*.



Cómo afrontar la APs con su reumatólogo

- 1 Cuénteles a su reumatólogo sobre los **síntomas que todavía presenta** con su tratamiento actual.
- 2 Informe con claridad que **no está satisfecho** con el impacto negativo que la APs sigue teniendo en su vida.
- 3 Pregunte a su reumatólogo sobre **cambiarse a RINVOQ**.

Obtenga más consejos sobre cómo colaborar con su reumatólogo. Visite RINVOQ.com/psa-partner



Si cumple los requisitos, pague tan solo \$0 al mes* por RINVOQ

Llame al **1.800.2RINVOQ** para confirmar su cobertura de seguro y copago de \$0 al mes para RINVOQ.

*Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial para RINVOQ® (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiamiento federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo, Medicare [incluida la Parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales. Esto no es un seguro médico. **Para ver los Términos y Condiciones completos, visite RinvoqSavingsCard.com, o llame al 1.800.2RINVOQ para obtener más información.** Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite <https://abbv.ie/corpprivacy>.



Uso

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños menores de 2 años con artritis psoriásica.

Consideraciones de Seguridad

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos, mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte más Información Importante de Seguridad en la página siguiente.

Consulte la Información de Prescripción Completa, incluida la Guía del Medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y hable con su médico.

abbvie

© 2026 AbbVie. Todos los derechos reservados. RINVOQ® y su diseño son marcas comerciales registradas de AbbVie Biotechnology Ltd.

US-RNQR-260048

USO E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con artritis psoriásica activa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados “bloqueantes del factor de necrosis tumoral” (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños menores de 2 años con artritis psoriásica.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas personas que tomaban RINVOQ, como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Antes de que usted comience a tomar RINVOQ, su proveedor de atención médica (HCP) deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB y mantenerlo bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su HCP le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su HCP podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su HCP en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (CV), especialmente en fumadores o exfumadores.**
- **Coágulos sanguíneos.** El uso de RINVOQ podría dar lugar a coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tenían al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (CV).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que toman RINVOQ, se han observado síntomas como sarpullido (urticaria), dificultad para respirar, desmayos o mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, los cuales podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.

- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones en los resultados de determinados análisis clínicos.** Su HCP deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su HCP podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

No tome RINVOQ si tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ. Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del Medicamento o el Resumen Breve para el Consumidor.

¿Qué debo decirle a mi HCP ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su HCP si:

- Está recibiendo tratamiento por una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, como los que se indican a continuación:
 - Fiebre, sudores o escalofríos
 - Falta de aliento
 - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
 - Dolores musculares
 - Sensación de cansancio
 - Sangre en las flemas
 - Diarrea o dolor de estómago
 - Tos
 - Pérdida de peso
 - Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la normal
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Tiene o ha tenido cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, como problemas del hígado, cifras bajas de glóbulos sanguíneos, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos (como los valles de los ríos Ohio y Misisipi y el Suroeste del país) donde hay un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos. Si no está seguro de si ha estado en estas áreas, pregúnteselo a su HCP.
- Ha recibido recientemente una vacuna o tiene programado recibirla. Las personas que tomen RINVOQ no deben recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios con animales demuestran que RINVOQ puede causar daño al feto. Su HCP determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Debe utilizar métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda que llame al 1-800-633-9110 para informar sobre el embarazo.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ puede pasar a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Informe a su HCP sobre todos los medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

Informe especialmente a su HCP si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no está seguro de si está tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su HCP o farmacéutico.

¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ, evite consumir comidas o bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que estas podrían aumentar el riesgo de efectos secundarios.

¿Qué debo hacer o decirle a mi HCP DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos los que se indican a continuación:
 - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
 - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
 - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
 - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
 - Sudores fríos repentinos
 - Náuseas o vómitos
 - Sensación de mareo
 - Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
 - Habla arrastrada
- Informe de inmediato a su HCP si durante el tratamiento con RINVOQ presenta cualquier signo o síntoma de coágulos sanguíneos, por ejemplo:
 - Hinchazón
 - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
 - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
 - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe de inmediato a su HCP si tiene fiebre o dolor abdominal persistente y algún cambio en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes se encuentran infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, infecciones de los senos paranasales); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; hinchazón de los pies y las manos (edema periférico); aumento de las concentraciones sanguíneas de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor en la zona del estómago (abdominal); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras más bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutrocitopenia, linfocitopenia, leucocitopenia); dolor muscular; enfermedad pseudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección estomacal e intestinal (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su HCP si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces. Si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo tomar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su HCP. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe saber sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés).

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarlo. Visite AbbVie.com/PatientAccessSupport para obtener más información.

Consulte la Información Completa sobre Prescripción (https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf), incluida la Guía del Medicamento (https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf#page=27), para RINVOQ.