RINVOQ es un inhibidor de las JAK indicado para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa en quienes los bloqueadores del TNF no funcionaron bien.

REBÉLESE CONTRA

la espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA)

Si aún tiene síntomas después de un bloqueante del TNF: **RINVOQ es diferente y puede ser de ayuda.**

USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación, cuando se ha utilizado un medicamento bloqueante del factor de necrosis tumoral (TNF) que no dio buenos resultados o no se pudo tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con espondiloartrosis axial no radiográfica.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

En un estudio clínico, RINVOQ ayudó a lograr un ALIVIO POTENTE de la rigidez y el dolor de espalda de la nr-axSpA.

RINVOQ ayudó a muchas personas a aliviar considerablemente sus síntomas de nr-axSpA en 14 semanas en comparación con el placebo (44.9% frente al 22.3%); algunas de ellas notaron mejoras **en tan solo 2 semanas**.

Redujo la actividad general de la enfermedad nr-axSpA, que se midió por medio de un cuestionario sobre distintos síntomas, como **dolores e hinchazón articulares, entesitis** (dolor e hinchazón en zonas como los talones y los codos) **y rigidez matutina.**

RINVOQ puede ofrecer a las personas noches con menos dolor de espalda y mejores días por delante.

Los pacientes con nr-axSpA pueden disfrutar de una mejor calidad de vida.

RINVOQ podría reducir el cansancio en la nr-axSpA.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

RINVOQ® upadacitinib

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

Para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación que no obtuvieron buenos resultados con bloqueantes del TNF.

Póngase en movimiento. Más RESULTADOS CON RINVOQ

RINVOQ ayudó a aumentar el funcionamiento físico y así facilitar las actividades cotidianas. Las personas en tratamiento con RINVOQ completaron un cuestionario, en el que se les preguntó sobre su capacidad para hacer actividades, por ejemplo:

- **Inclinarse desde la cintura para recoger objetos del piso.**
- **Subir 12 a 15 escalones sin tomarse de la baranda.**
- **Hacer actividades durante todo el día, en casa o en el trabajo.**
- **Levantarse de una silla sin ayuda.**

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

RINVOQ® upadacitinib

Para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación que no obtuvieron buenos resultados con bloqueantes del TNF.

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

RINVOQ:

UNA PASTILLA AL DÍA

NO ES UNA INYECCIÓN

- **Tome RINVOQ una vez al día, todos los días.**
- **Puede tomar RINVOQ con o sin alimentos.**
  - Evite consumir alimentos o bebidas que contengan toronja (pomelo)
  - No parta, triture ni mastique la pastilla
- **Entre usted y su médico determinarán el plan de tratamiento óptimo.**

Si nota que hay residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces, llame a su proveedor de atención médica.

Frasco fácil de abrir

RINVOQ fue galardonado con el premio de reconocimiento a la facilidad de uso de la Arthritis Foundation, por la innovadora tapa del frasco, su perfil ancho y su empuñadura para abrir fácilmente.

Arthritis Foundation Certified EASE OF USE

Vea cómo se abre el frasco en RINVOQ.com/nr-axSpA-bottle



RINVOQ EN ACCIÓN

En la nr-axSpA, el sistema inmunitario está hiperactivo y ataca la columna vertebral.

RINVOQ es un inhibidor de las JAK (cinasa jano) que REGULA el sistema inmunitario hiperactivo para AYUDAR A DETENER el ataque.

RINVOQ actúa en el interior de las células para bloquear determinadas señales que al parecer son una causa subyacente de inflamación en la nr-axSpA.

Obtenga más información sobre la ciencia que respalda a RINVOQ y su modo de acción en RINVOQ.com/nr-axSpA-science

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Hay algunos medicamentos que no se deben usar al mismo tiempo que RINVOQ. **Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use,** incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

RINVOQ® upadacitinib

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

Para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación que no obtuvieron buenos resultados con bloqueantes del TNF.

Sea sincero con su REUMATÓLOGO

Si su actual plan de tratamiento no le está dando los resultados que usted quiere, hable abiertamente con un reumatólogo sobre sus metas y opciones terapéuticas.

Visite RINVOQ.com/nr-axSpA-checklist a fin de obtener una Lista de verificación para citas que contiene temas de conversación para compartir con su reumatólogo.

Su reumatólogo deberá:

- **Preguntarle sobre el efecto de sus síntomas en su vida diaria**
- **Colaborar con usted para elaborar un plan de tratamiento y establecer metas**
- **Dar seguimiento a su evolución y las mejoras de sus síntomas**
- **Hacer ajustes adecuados a su plan de tratamiento si usted no está alcanzando sus metas**

No se conforme con los síntomas de la nr-axSpA cuando puede DEFENDERSE

Busque un reumatólogo cerca de su domicilio.
Visite **RINVOQ.com/nr-axSpA-rheum >**

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.**
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

RINVOQ® upadacitinib

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

Para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación que no obtuvieron buenos resultados con bloqueantes del TNF.

Estamos con USTED

Una vez que usted y su médico decidan hacerle frente a la nr-axSpA con RINVOQ, usted tendrá acceso a **RINVOQ Complete**: una experiencia individualizada y personalizada que le da los recursos que necesita cuando los necesita. Ya sea con ayuda con el seguro o los ahorros, cómo incorporar RINVOQ a su vida o recursos para ayudarlo a mantenerse encaminado con el plan de tratamiento indicado, su **Enfermero embajador de RINVOQ Complete*** estará disponible para ayudarlo en cada paso del camino.

Independientemente de su cobertura de seguro, su Enfermero embajador específico puede ponerlo en contacto con un Especialista en Seguros, que puede ayudarlo a comprender de qué se trata su cobertura e identificar posibles maneras de ahorrar en sus recetas.

Con la tarjeta de ahorros RINVOQ Complete, **podría pagar desde apenas $5/mes†.**

RINVOQ® COMPLETE

PARA INSCRIBIRSE, USTED PUEDE:

Hacer los trámites con el consultorio de su médico

Enviar un texto con la palabra "ENROLL" o llamar al 1-800-2RINVOQ (1-800-274-6867)

1 mensaje/solicitud. Podrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Visite www.abbvie.com/privacy.html para ver información sobre las prácticas de privacidad de AbbVie y SeeRTerms.com para ver los términos y condiciones.

Visitar RINVOQcomplete.com

*Los Enfermeros embajadores son un servicio de AbbVie y no trabajan bajo la dirección del proveedor de atención médica que lo atiende a usted ni proporcionan recomendaciones médicas. Están capacitados para remitir a los pacientes a sus proveedores de atención médica para obtener recomendaciones de tratamiento, lo que incluye otras derivaciones.

†Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial de RINVOQ® (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiamiento federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo, Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales. Esto no es un seguro médico. **Para ver los Términos y condiciones completos, visite www.RINVOQSavingsCard.com o llame al 1-800-2RINVOQ para obtener más información.** Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite **https://privacy.abbvie**.

RINVOQ® upadacitinib

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

Para adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación que no obtuvieron buenos resultados con bloqueantes del TNF.

USO E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con espondiloartrosis axial no radiográfica (nr-axSpA) activa con signos objetivos de inflamación, cuando se ha utilizado un medicamento bloqueante del factor de necrosis tumoral (TNF) que no dio buenos resultados o no se pudo tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con espondiloartrosis axial no radiográfica.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer. Podría presentarse linfoma y otros tipos de cáncer, como cánceres de la piel. Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular), especialmente en fumadores o exfumadores.**
- **Coágulos sanguíneos.** Con RINVOQ pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias, los cuales podrían ser potencialmente mortales e incluso causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones de algunos análisis clínicos.** Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ. Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- Está recibiendo tratamiento por una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, tales como:
  - Fiebre, sudores o escalofríos
  - Falta de aliento
  - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
  - Dolores musculares
  - Cansancio
  - Sangre en las flemas
  - Diarrea o dolor de estómago
  - Tos
  - Pérdida de peso
  - Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la normal
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Ha tenido o tiene cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, tales como problemas del hígado, bajas cifras de glóbulos sanguíneos, diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, el VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país, en que el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos es mayor. Si no sabe con certeza si ha estado en estos tipos de regiones, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
- Recibió recientemente una vacuna o tiene programado recibir alguna. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda que informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

RINVOQ® upadacitinib

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 7 y 8.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continúa de la página anterior)

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no sabe con certeza si ha está tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ deberá evitar los alimentos y las bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
  - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
  - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
  - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
  - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
  - Sudores fríos repentinos
  - Náuseas o vómitos
  - Sensación de mareo
  - Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
  - Habla arrastrada
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta cualquier signo o síntoma de coágulos de sangre; por ejemplo:
  - Hinchazón
  - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
  - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
  - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor abdominal persistente y algún cambio en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad seudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces; si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo usar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y consulte con su médico.

abbvie

© 2023 AbbVie. Todos los derechos reservados.
RINVOQ® y su diseño son marcas registradas de AbbVie Biotechnology Ltd.
US-RNQR-230494 Septiembre de 2023

RINVOQ® upadacitinib