

USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con colitis ulcerosa de moderada a intensa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF, por sus siglas en inglés) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con colitis ulcerosa.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.

Consulte más Información Importante de Seguridad en las páginas 14 y 15. Consulte la **Información de Prescripción Completa**, incluida la **Guía del Medicamento**, para RINVOQ en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y hable con su médico.

Uso de RINVOQ Apoyo Individual Información Importante de Seguridad

HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS

APUNTE ALTO

con sus metas de tratamiento

Con la CU de moderada a intensa, no debería tener que escoger entre un alivio rápido y la remisión duradera. Piense más allá del control de los síntomas y apunte alto para alcanzar la remisión duradera, así como la posible reparación de la mucosa del colon.

Aspire a obtener un alivio y remisión duraderos

Hable con su gastroenterólogo sobre cómo anticiparse a la CU con metas a corto y largo plazo:



Alivio

RAPIDO da los síntemas

Remisión



DURADERA

duradera sin usar corticoesteroides



Reducción de la inflamación, con

REPARACION VISIBLE

de la mucosa del colon

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





APUNTE ALTO

con sus metas de tratamiento

Con la CU de moderada a intensa, no debería tener que escoger entre un alivio rápido y la remisión duradera. Piense más allá del control de los síntomas y apunte alto para alcanzar la remisión duradera, así como la posible reparación de la mucosa del colon.

Mire la diferencia: Daño del colon y reparación visible de la mucosa del colon

Con la CU, la hiperactividad del sistema in<u>munitario</u> causa inflamación, la cual conlleva más que solo síntomas, ya que esta daña la mucosa del colon. **Por eso es importante pensar más allá del alivio de los síntomas y apuntar a reparar visiblemente la mucosa del colon.**

Ejemplo de los resultado de una colonoscopia:



Mucosa del colon con daño visible causado por la inflamación



Mucosa del colon sana sin daño causado por la inflamación

Recuerde

La CU puede dañar la mucosa del colon, incluso cuando los síntomas no sean los peores. **Por lo tanto,** asegúrese de preguntarle a su médico acerca de una opción de tratamiento que pueda ayudar al cuerpo a reparar visiblemente la mucosa del colon*.

.* Puede que las zonas que se evaluaron visualmente no representen la reparación de la mucosa del colon en su totalidad.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD


- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.



con RINVOQ

Para adultos con colitis ulcerosa (CU) de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien


Tan solo 8 semanas después de comenzar a recibir RINVOQ, **muchas personas (~3 de cada 10)** lograron la remisión





SEMANA 8


7 de cada 10 personas **tuvieron una** mejoría de los síntomas*



REPARACIÓN VISIBLE DE LA MUCOSA DEL COLON[†]

SEMANA 8

Muchas personas obtuvieron una mejoría visible de la mucosa del colon



* En función de la frecuencia de las deposiciones, la cantidad de deposiciones sanguinolentas y el aspecto físico de la mucosa del colon. †Puede que las zonas que se evaluaron visualmente no representen la reparación de la mucosa del colon en su totalidad.

A las 8 semanas, RINVOQ ayuda a los pacientes a no tener urgencia intestinal, no sentir dolor abdominal y reducir significativamente el agotamiento

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

Continúa en la página siguiente 🙈

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





Acerca de RINVOQ

Hable con su Médico Uso de RINVOQ Apoyo Individual Información Importante de Seguridad

▲ HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS


RESULTADOS QUE DURAN de eso se trata RINVOQ

Para adultos con colitis ulcerosa (CU) de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien

1 AÑO


REMISIÓN DURADERA SIN CORTICOESTEROIDES

% de personas en remisión a la semana 8 que **lograron una remisión duradera sin corticoesteroides tras 1 año**



REPARACIÓN VISIBLE DE LA MUCOSA DEL COLON*

% de personas que obtuvieron una **mejoría visible de la mucosa del colon**



* Puede que las zonas que se evaluaron visualmente no representen la reparación de la mucosa del colon en su totalidad

REMISIÓN TRAS 1 AÑO:

El 42% de las personas que tomaron RINVOQ de 15 mg y el 52% de las personas que tomaron RINVOQ de 30 mg lograron la remisión, en comparación con el 12% de las personas que recibieron el placebo

El impacto de la reparación visible de la mucosa del colon

Una mucosa del colon visiblemente reparada es un componente clave para lograr la remisión. El tratamiento adecuado puede reducir la inflamación que afecta la mucosa del colon y abrirle el camino hacia su reparación.

Vea la reparación de la mucosa del colon en acción Visite RINVOQ.com/UC-repair

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.




Uso de RINVOQ Apoyo Individual Información Importante de Seguridad

A HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS A



¿Qué es RINVOQ?



"RINVOQ es una pastilla que se toma una vez al día para adultos con CU de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien".

Cómo actúa RINVOQ

RINVOQ actúa con su organismo para combatir la inflamación que puede ocasionar los síntomas de la CU.

Las causas del exceso de inflamación pueden ser diferentes proteínas, como las cinasas Jano (JAK, por sus siglas en inglés), que se encuentran naturalmente en el organismo.

RINVOQ se dirige a algunas proteínas JAK para ayudar a reducir la inflamación.

Mire el video para echar un vistazo más a fondo Visite RINVOQ.com/UC-science

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.







¿Se enfrenta a síntomas de la CU como urgencia intestinal y dolor abdominal? **No está solo.** Los pacientes reales que usan RINVOQ están manteniendo la CU bajo control.

Vea cómo Katie y más personas tomaron las riendas con RINVOQ.

Visite RINVOQ.com/UC-patients



Gracias a que tengo mis síntomas bajo control, puedo planificar los viajes que quiero.



- **KATIE**, paciente con CU de moderada a intensa

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.



Metas y Resultados de Tratamiento

Acerca de **RINVOQ**

Hable con su Médico

Uso de RINVOQ

Apoyo Individual

Información Importante de **Seguridad**

HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS

¿Es RINVOQ adecuado



Este cuestionario se elaboró para evaluar la repercusión general que la CU de moderada a intensa tiene en su vida y si es el momento adecuado para usar RINVOQ.

Lleve las respuestas a estas preguntas a su próxima cita con el gastroenterólogo. Lo ayudarán a iniciar una conversación para asegurarse de que su plan de tratamiento dé prioridad a las metas a largo plazo.

¿Aproximadamente cuántas veces al dia va al baño?	¿Cuál es la repercusión general de la CU en su capacidad para trabajar o hacer planes sociales?
veces en unveces en un día bueno día malo	1—2—3—4—5 Ninguna Una gran repercusión repercusión
¿Qué síntomas son los más molestos? Ensuciarse repentinamente o tener una necesidad imperiosa de ir al baño Dolor Deposiciones sanguinolentas Aumento de la frecuencia de las deposiciones ¿Cómo describiría sus síntomas? En un día bueno: 1—2—3—4—5 Ninguna Una gran repercusión En un día malo: 1—2—3—4—5 Ninguna Una gran repercusión En un día malo: 1—2—3—4—5 Ninguna Una gran repercusión	¿Con qué frecuencia le es imposible salir de su casa a causa de los síntomas? Rara vez Al menos una vez por semana De vez en cuando Con qué frecuencia le es imposible hacer las actividades cotidianas a causa de los síntomas? Rara vez Al menos una vez por semana De vez en cuando Todos los días Todos los días

Continúa en la página siguiente 🥕



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





Metas y Resultados de **Tratamiento**

Acerca de **RINVOQ**

Hable con su Médico

Uso de RINVOQ

Apoyo Individual

Información Importante de Seguridad

A HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS A



	Su gastroenterólogo puede hablar sobre la "reparación de la mucosa del colon". ¿Está familiarizado con este concepto?				
		Sí	No	No del todo	
'Reparación de la mucosa del colon" significa que su gastroenterólogo no observa evidencia de CU activa durante					
una endos	copia.				

Eche un vistazo a sus respuestas del cuestionario. Si experimenta cualquiera de estas cosas...



Hace más de 6 visitas al baño en un solo día



Ha descrito la repercusión de sus síntomas con un 3,405



Las actividades cotidianas, el trabajo o los planes sociales se ven limitados o interrumpidos a causa de la CU

...RINVOQ puede ser adecuado para usted.

HABLE con su gastroenterólogo y pregúntele cómo RINVOQ puede ayudar a lograr y mantener la remisión.

Pruebe estos temas de conversación en su próxima cita

- > Hay días en los que mis síntomas de CU realmente interfieren, así que quiero ser más proactivo con mi plan de tratamiento. ¿Cómo podría ayudar RINVOQ?
- ¿Qué más puede contarme sobre los resultados del estudio clínico de RINVOQ?
- > ¿De qué maneras ha ayudado RINVOQ a otras personas con CU a alcanzar sus metas a largo plazo, como la remisión duradera y la reparación de la mucosa del colon?
- ¿De qué consideraciones de seguridad debería estar informado con respecto a RINVOQ?

Convertir sus metas a largo plazo en una realidad: ahí es donde RINVOQ puede ayudar. Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre RINVOQ.

Visite RINVOQ.com/UC-signup

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





Términos relacionados con la CU que debería conocer para sus citas

El tiempo que pase con su gastroenterólogo es valioso y las citas pueden abarcar diversos temas. Esta lista de términos que se utilizan frecuentemente y sus definiciones podrá ayudarle a refrescar sus conocimientos, de manera que pueda aprovechar sus citas para tener conversaciones más profundas sobre cómo abordar y tratar la CU de moderada a intensa.

Colon

Órgano del sistema digestivo que absorbe agua y otros elementos de los alimentos parcialmente digeridos para formar heces que se expulsan del cuerpo. Al colon también se le llama intestino grueso.

Daño del colon

Presencia de sangre, erosiones o úlceras en el colon causadas por un exceso de inflamación.

Colonoscopia

Examen en el que se utiliza una pequeña cámara que se introduce por el ano para observar el colon o el recto a fin de diagnosticar y controlar la intensidad de la CU.

Endoscopia

Procedimiento en el que se utiliza un instrumento flexible similar a un tubo con una luz y una lente que se introduce por la boca o el ano para visualizar el interior del tracto gastrointestinal (GI) a fin de controlar su enfermedad y las posibles complicaciones.

Continúa en la página siguiente 🥒



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





Exacerbación

Período en el que una persona que padece CU experimenta crisis de inflamación y síntomas asociados. La acumulación de inflamación dañina para el colon es un factor que puede contribuir a las exacerbaciones.

Inflamación

Defensa natural del sistema inmunitario, como enrojecimiento o hinchazón, ante daños. Cuando se padece CU, el sistema inmunitario puede causar inflamación crónica, que contribuye al daño del colon y a los síntomas de la CU.

Remisión

Período en el que una persona experimenta menos síntomas de CU, o ninguno, y la mucosa del colon ha mejorado visualmente. Su gastroenterólogo puede confirmar que usted está en remisión en función de la frecuencia de las deposiciones, la ausencia de deposiciones sanguinolentas y una mejoría visual de la mucosa del colon observada en los resultados de una endoscopia. Evalúe opciones de tratamiento que ofrezcan una remisión duradera, incluso tras 1 año.

Intensidad

En el caso de la CU, la intensidad se determina en función de la inflamación y el daño de la mucosa del colon, los antecedentes de CU y el grado en que la CU le afecta, incluidos los síntomas medibles. Esto se suma a la confirmación por parte de su gastroenterólogo de que usted padece "CU de moderada a intensa", lo cual se basa en la frecuencia de las deposiciones y la presencia de sangre en las deposiciones.

Úlcera

Llaga abierta que es una característica frecuente de la CU; las úlceras aparecen en la mucosa del colon.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.



Incorpore RINVOQ a 50 COMMA



Tome una pastilla una vez al día.



RINVOQ puede tomarse con o sin alimentos. Evite consumir alimentos o bebidas que contengan toronja (pomelo).



No parta, triture ni mastique la pastilla.

Si nota que hay residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces, llame a su proveedor de atención médica.

- Disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg
- Su médico le recetará la dosis que sea adecuada para usted
- Use RINVOQ exactamente según las indicaciones de su médico



Posibilidad de remisión duradera tras un año, sin necesidad de corticoesteroides. De eso se trata el alivio de RINVOQ.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.





completamente a su manera



RINVOQ Complete brinda apoyo individual según los recursos que necesite y cuándo los necesite.



Embajador de RINVOQ Complete* El apoyo en directo de su Embajador implica

- Conocerlo para brindarle orientación individual
- Responder a preguntas sobre seguros y encontrar formas de ayudarlo a ahorrar en RINVOQ
- Ayudarlo a seguir su rutina con RINVOQ



Aplicación RINVOQ Complete

Una aplicación diseñada para ayudarlo a seguir el curso de su plan de tratamiento recetado. Establezca recordatorios para tomarse los medicamentos y realice un seguimiento de sus dosis, todo en la palma de su mano.



Chat 24/7

lo siguiente:

¡Comuníquese por chat en vivo cuando quiera! Disponible las 24 horas del día para sus necesidades de apoyo con respecto a RINVOQ.



RINVOQ podría costarle solo \$5 al mes[†]

Llame al 1-800-2RINVOQ para inscribirse en RINVOQ Complete

Para obtener más información, incluido cómo inscribirse, consulte el sitio de RINVOQ Complete.

Visite RINVOQ.com/complete

*Los Enfermeros embajadores constituyen un servicio de AbbVie y no trabajan bajo la dirección del proveedor de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés) que lo atiende a usted ni proporcionan recomendaciones médicas.

Están capacitados para remitir a los pacientes a sus proveedores de atención médica para obtener recomendaciones de tratamiento, lo que incluye otras derivaciones.

†Para pacientes elegibles con cobertura de seguro comercial. Consulte los Términos y Condiciones a continuación.

Términos y Condiciones de la Tarjeta de Ahorros RINVOQ Complete

Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial para RINVOQ® (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiamiento federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo, Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales.

Esto no es un seguro médico. Para ver los Términos y Condiciones completos, visite RINVOQSavingsCard.com, o llame al 1.800.2RINVOQ para obtener más información. Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite https://abbvie/corpprivacy.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. Aumento del riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.
- Coágulos de sangre (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- Reacciones alérgicas graves. Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.



USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con colitis ulcerosa de moderada a intensa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF, por sus siglas en inglés) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con colitis ulcerosa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- Infecciones graves. RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- Cáncer y problemas del sistema inmunitario. RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados cánceres, tales como linfoma y cánceres de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte, en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad CV), especialmente en el caso de los fumadores y los exfumadores.
- Coágulos de sangre. Con RINVOQ pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto podría ser potencialmente mortal y causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- Reacciones alérgicas. En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua

o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.

- Desgarros en el estómago o los intestinos. Esto ocurre más a menudo en personas que toman antinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- Alteraciones de algunos análisis clínicos. Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ. Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- Está recibiendo tratamiento para una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, tales como:
 - Fiebre, sudores o escalofríos
 - Falta de aliento
- Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
- Dolores muscularesCansancio
- Sangre en las flemas
- Diarrea o dolor de estómago
- Tos
- Pérdida de peso
- Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la normal
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Ha tenido o tiene cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, como problemas del hígado, cifras bajas de glóbulos sanguíneos, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o ha viajado a) partes de Estados Unidos, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país, en que el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos es mayor. Si no sabe con certeza si ha estado en estos tipos de regiones, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.

Vea más Información Importante de Seguridad sobre RINVOQ en la página siguiente.

Consulte la Información de Prescripción Completa, incluida la Guía del Medicamento, para RINVOQ en http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y hable con su médico.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación de la página anterior)

- Recibió recientemente una vacuna o tiene programado recibir alguna. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Debe utilizar métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda que informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario
 Si no sabe con certeza si está tomando alguno de estos medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ deberá evitar los alimentos y las bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos los siguientes:
 - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
 - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
 - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
 - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
 - Sudores fríos repentinos

- Náuseas o vómitos
- Sensación de mareo
- Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
- Habla arrastrada
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta signos o síntomas de coágulos sanguíneos; por ejemplo:
 - Hinchazón
 - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
- Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
- Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor de estómago que no cede y cambios en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad seudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces. Si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo usar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.

Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite

www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarlo. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Consulte la Información de Prescripción Completa, incluida la Guía del Medicamento, para RINVOQ en http://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y hable con su médico.

