



Metas y resultados de tratamiento

Acerca de RINVOQ

Hable con su gastroenterólogo

Uso de RINVOQ

Apoyo personalizado

Información importante de seguridad

▲ HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS ▲



Su

# GUÍA

## sobre RINVOQ para la colitis ulcerosa (CU)

Una pastilla que se toma una vez al día para adultos con CU de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien

Inscríbese para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre RINVOQ

Visite [RINVOQ.com/UC-signup](https://www.rinvoq.com/UC-signup)

### USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con colitis ulcerosa de moderada a intensa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con colitis ulcerosa.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía del medicamento**, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



▲ Haga clic en las pestañas de arriba para saber más ▲

# APUNTE ALTO con sus metas de tratamiento

Con la CU de moderada a intensa, no debería tener que escoger entre un alivio rápido y la remisión duradera. Piense más allá del control de los síntomas y apunte alto para alcanzar la remisión duradera, así como la posible reparación de la mucosa del colon.

## Aspire a obtener un alivio y remisión duraderos

Hable con su gastroenterólogo sobre cómo anticiparse a la CU, con metas a corto y largo plazo:



**Alivio rápido de los síntomas**



**Remisión duradera sin usar corticoesteroides**



**Reducción de la inflamación, con una reparación/mejoría visible de la mucosa del colon**


## Mire la diferencia: Daño y reparación de la mucosa del colon

Con la CU, la hiperactividad del sistema inmunitario causa inflamación que daña la mucosa del colon. Por eso, reducir la inflamación es una meta importante de tratamiento; da una oportunidad de que se repare la mucosa del colon.

### Ejemplo del resultado de una colonoscopia:



Mucosa del colon con daño visible causado por la inflamación



Mucosa del colon sana sin daño causado por la inflamación

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Metas y resultados de tratamiento

Acerca de RINVOQ

Hable con su gastroenterólogo

Uso de RINVOQ

Apoyo personalizado

Información importante de seguridad

HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS

# ALIVIO RÁPIDO con RINVOQ


Para adultos con colitis ulcerosa (CU) de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien

Tan solo 8 semanas después de comenzar a recibir RINVOQ, muchas personas (~3 de cada 10) lograron la remisión

## SEMANA 2

### ALIVIO RÁPIDO DE LOS SÍNTOMAS


El 60% de las personas informaron **menos deposiciones frecuentes y sanguinolentas**



## SEMANA 8

### MEJORÍA DE LOS SÍNTOMAS


7 de cada 10 personas **tuvieron una mejoría de los síntomas\***



## SEMANA 8

### REPARACIÓN VISIBLE DE LA MUCOSA DEL COLON†

Muchas personas obtuvieron una **mejoría visible de la mucosa del colon**



\*En función de la frecuencia de las deposiciones, la cantidad de deposiciones sanguinolentas y el aspecto físico de la mucosa del colon.  
†Puede que las zonas que se evaluaron visualmente no representen la reparación de la mucosa del colon en su totalidad.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**

Continúa en la página siguiente



Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



Metas y resultados de tratamiento

Acerca de RINVOQ

Hable con su gastroenterólogo

Uso de RINVOQ

Apoyo personalizado

Información importante de seguridad

HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS


# RESULTADOS QUE DURAN de eso se trata RINVOQ

## 1 AÑO

Para adultos con colitis ulcerosa (CU) de moderada a intensa en quienes los bloqueantes del TNF no funcionaron bien


### REMISIÓN DURADERA SIN CORTICOESTEROIDES

% de personas en remisión a la semana 8 que **lograron una remisión duradera sin corticoesteroides** tras 1 año



### REPARACIÓN VISIBLE DE LA MUCOSA DEL COLON\*

% de personas que obtuvieron una **mejoría visible de la mucosa del colon**



### REMISIÓN TRAS 1 AÑO:

El **42%** de las personas que tomaban RINVOQ 15 mg y el **52%** de las personas que tomaban RINVOQ 30 mg **lograron la remisión**, en comparación con el **12%** de las personas que recibían el placebo

Su médico le recetará la dosis que sea adecuada para usted. Use RINVOQ exactamente según las indicaciones de su médico.

\*Puede que las zonas que se evaluaron visualmente no representen la reparación de la mucosa del colon en su totalidad.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía del medicamento**, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



# CÓMO ACTÚA RINVOQ

## ¿Qué es RINVOQ?

Es posible que los bloqueantes del TNF no den buenos resultados en algunas personas. RINVOQ no es una infusión o inyección. Es una pastilla que se toma una vez al día para adultos con CU de moderada a intensa. RINVOQ actúa con su organismo para combatir la inflamación que puede ocasionar los síntomas de la CU.



Su cuerpo tiene proteínas que se elaboran de forma natural y que colaboran con el sistema inmunitario para informarle de dónde y cuándo debe haber inflamación.

RINVOQ detiene la actividad de determinadas proteínas que se denominan cinasas Jano (JAK), que se cree que contribuyen a la hiperactividad del sistema inmunitario. Es así como RINVOQ actúa con su organismo para ayudar a detener la inflamación excesiva que puede dañar la mucosa del colon.

Mire el video para echar un vistazo más a fondo  
Visite [RINVOQ.com/UC-science](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf)

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**





▲ HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS ▲

# ¿ES RINVOQ ADECUADO PARA USTED?

7

¿Con qué frecuencia interrumpen los síntomas de la CU lo que está haciendo?

Rara vez

De vez en cuando

Al menos una vez por semana

Todos los días

Eche un vistazo a sus respuestas del cuestionario. Si experimenta cualquiera de estas cosas...



Hace más de **6 visitas** al baño en un solo día



Ha descrito la repercusión de sus síntomas con un **3, 4 o 5**



Las actividades cotidianas, el trabajo o los planes sociales **se ven limitados o interrumpidos** a causa de la CU

...Pregunte a su gastroenterólogo cómo RINVOQ podría ayudar a lograr y mantener la remisión.

## Pruebe estos temas de conversación en su próxima cita

- Hay días en los que mis síntomas de CU realmente interfieren, así es que quiero ser más proactivo con mi plan de tratamiento. ¿Cómo podría ayudar RINVOQ?
- ¿De qué maneras ha ayudado RINVOQ a otras personas con CU a alcanzar sus metas a largo plazo, como la remisión duradera y la reparación de la mucosa del colon?
- ¿Qué más puede contarme sobre los resultados de los estudios clínicos de RINVOQ?
- ¿De qué consideraciones de seguridad debería estar informado con RINVOQ?

Convertir sus metas a largo plazo en una realidad: ahí es donde RINVOQ puede ayudar.

Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre RINVOQ. Visite [RINVOQ.com/UC-signup](https://www.rinvoq.com/UC-signup)

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



# Hable con **CONFIANZA**

## Términos relacionados con la CU que debería conocer para sus citas

El tiempo que pase con su gastroenterólogo es valioso y las citas pueden abarcar diversos temas. Esta lista de términos que se utilizan frecuentemente y sus definiciones podrá ayudarlo a refrescar sus conocimientos, de manera que pueda aprovechar sus citas para tener conversaciones más profundas sobre cómo abordar y tratar la CU de moderada a intensa.

### Colon

Órgano del sistema digestivo que absorbe agua y otros elementos de los alimentos parcialmente digeridos para formar heces que se expulsan del cuerpo. Al colon también se le llama intestino grueso

### Daño del colon

Presencia de sangre, erosiones y/o úlceras en el colon causadas por un exceso de inflamación

### Colonoscopia

Exploración del colon y/o el recto con una pequeña cámara. Mediante una colonoscopia, se evalúa la intensidad de la inflamación y/o las úlceras características de la CU

### Endoscopia

Procedimiento en el que se utiliza un instrumento flexible similar a un tubo con una luz y una lente, que se introduce en la boca o el ano, para visualizar el interior del tubo digestivo. La endoscopia se utiliza para diagnosticar la CU y vigilar la enfermedad y las posibles complicaciones

Continúa en la página siguiente 

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



# Hable con **CONFIANZA**

## Exacerbación

Período en el que una persona experimenta síntomas de CU. La acumulación de inflamación dañina para el colon es un factor que puede contribuir a las exacerbaciones

## Inflamación

Defensa natural del sistema inmunitario, como enrojecimiento o hinchazón, ante daños. Cuando se padece CU, el sistema inmunitario puede causar inflamación crónica, que contribuye al daño del colon y a los síntomas de la CU

## Remisión

Período en el que una persona experimenta menos síntomas de CU, o ninguno, y la mucosa del colon ha mejorado visualmente. Su gastroenterólogo puede confirmar que usted está en remisión en función de la frecuencia de las deposiciones, la ausencia de deposiciones sanguinolentas y una mejoría visual de la mucosa del colon observada en los resultados de una endoscopia. Evalúe opciones de tratamiento que ofrezcan una remisión duradera, incluso tras 1 año

## Intensidad

En general, la intensidad indica el grado en el que la CU le afecta, lo que incluye los síntomas mensurables, así como aspectos como su capacidad para finalizar los quehaceres o tener actividades sociales. Si su gastroenterólogo le dice que tiene "CU de moderada a intensa", lo cual podría suceder en función de la frecuencia de las deposiciones y la presencia de sangre en las deposiciones, no debe confundirse con este concepto de intensidad

## Úlcera

Llaga abierta que es una característica frecuente de la CU; las úlceras aparecen en la mucosa del colon

### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Metas y resultados de tratamiento

Acerca de RINVOQ

Hable con su gastroenterólogo

Uso de RINVOQ

Apoyo personalizado

Información importante de seguridad

▲ Haga clic en las pestañas de arriba para saber más ▲

# TRATAMIENTO QUE SE ajusta a su vida



Tome una pastilla una vez al día



RINVOQ puede tomarse con o sin alimentos. Evite consumir alimentos o bebidas que contengan toronja (pomelo).



No parta, triture ni mastique la pastilla

- Disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg
- Su médico le recetará la dosis que sea adecuada para usted
- Use RINVOQ exactamente según las indicaciones de su médico



La pastilla no se muestra a tamaño real

**Aproveche al máximo su tratamiento para la CU de moderada a intensa incorporándolo a su rutina. Tome RINVOQ a la misma hora todos los días.**

**Posibilidad de remisión duradera tras 1 año, sin necesidad de corticoesteroides. De eso se trata el alivio de RINVOQ.**

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía del medicamento**, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



Metas y resultados de tratamiento

Acerca de RINVOQ

Hable con su gastroenterólogo

Uso de RINVOQ

Apoyo personalizado

Información importante de seguridad

▲ HAGA CLIC EN LAS PESTAÑAS DE ARRIBA PARA SABER MÁS ▲

# SIEMPRE ES UN EXCELENTE MOMENTO PARA CONECTARSE

## RINVOQ<sup>®</sup> COMPLETE

RINVOQ Complete brinda una experiencia personalizada basada en las cosas que necesita, cuando las necesita; ya sea tratar de entender su cobertura de seguro o descubrir formas de ayudarlo a ahorrar.



### Enfermeros embajadores\*

Están presentes en cada etapa, incluso para ayudarlo a entender la CU y su tratamiento.



### App RINVOQ Complete

Ayuda a establecer una rutina diaria personal y acceder a recursos adicionales.

Consulte el sitio de RINVOQ Complete para obtener más información sobre el programa, incluido cómo comenzar.

Descubra RINVOQ Complete  
[RINVOQ.com/complete](https://RINVOQ.com/complete)

## Apoyo personalizado desde el inicio



\$5

Pague desde apenas \$5/mes con un seguro comercial†

Su Enfermero embajador podrá conectarlo con un especialista en seguros para determinar si esta opción es adecuada para usted.

\* Los Enfermeros embajadores son un servicio de AbbVie y no trabajan bajo la dirección del proveedor de atención médica que lo atiende a usted ni proporcionan recomendaciones médicas. Están capacitados para remitir a los pacientes a sus proveedores de atención médica para obtener recomendaciones de tratamiento, lo que incluye otras derivaciones.

#### Términos y condiciones de la tarjeta de ahorros RINVOQ Complete

† Elegibilidad: Disponible para pacientes con cobertura de seguro comercial de RINVOQ<sup>®</sup> (upadacitinib) que cumplan los criterios de elegibilidad. Este programa de asistencia con los copagos no está disponible para pacientes que reciban un reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de algún programa de seguro con financiamiento federal, estatal o gubernamental (como, por ejemplo, Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) ni donde esté prohibido por ley. La oferta se encuentra sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso. Podrán aplicarse limitaciones, tales como máximos mensuales. Esto no es un seguro médico. **Para ver los términos y condiciones completos, visite [RINVOQSavingsCard.com](https://RINVOQSavingsCard.com), o llame al 1.800.2RINVOQ para obtener más información.** Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie y las opciones de privacidad con las que usted cuenta, visite <https://privacy.abbvie>.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves (en algunos casos mortales), tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener linfoma y cáncer de pulmón.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía, especialmente en fumadores y exfumadores.**
- **Coágulos de sangre** (en algunos casos, mortales) en venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía.
- **Reacciones alérgicas graves.** Si usted le tiene alergia a RINVOQ o a sus componentes, no lo tome.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos; alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.**



Consulte más Información importante de seguridad en las páginas 12 y 13. Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.



## USO

RINVOQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para el tratamiento de adultos con colitis ulcerosa de moderada a intensa, cuando se han utilizado 1 o más medicamentos llamados "bloqueantes del factor de necrosis tumoral" (TNF) que no dieron buenos resultados o no se pudieron tolerar. Se desconoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con colitis ulcerosa.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

#### RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves en algunas personas que tomaban RINVOQ, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Antes de que usted comience a tomar RINVOQ, su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar su riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer. Podría presentarse linfoma y otros tipos de cáncer, como cánceres de la piel. Los fumadores o los exfumadores corren un mayor riesgo de tener ciertos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Póngase indumentaria protectora cuando esté expuesto a la luz solar y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte, en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad CV), especialmente en el caso de los fumadores y los exfumadores.**
- **Coágulos de sangre.** Con el uso de RINVOQ podrían presentarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Estos problemas podrían ser potencialmente mortales y causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tenían al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (CV).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria), dificultad para respirar, desmayos, mareos o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, los cuales podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica.

Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.

- **Desgarros en el estómago o los intestinos y alteraciones de algunos resultados de análisis clínicos.** Antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento, su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre. Si es necesario, su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

**No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.** Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

### ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- Está recibiendo tratamiento para una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección tales como:
 

- Fiebre, sudores o escalofríos	- Dolores musculares	- Tos
- Falta de aliento	- Sensación de cansancio	- Pérdida de peso
- Enrojecimiento, calor o dolor de la piel o llagas en el cuerpo	- Sangre en la flema	- Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la habitual
	- Diarrea o dolor de estómago	
- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Tiene o ha tenido cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster) o coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, como problemas del hígado, cifras bajas de glóbulos sanguíneos, una enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos (como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país) donde hay un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos. Si no está seguro de si ha estado en estas áreas, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.

**Consulte la Información importante de seguridad sobre RINVOQ en la página siguiente.**

**Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.**



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (viene de la página anterior)

- Ha recibido recientemente una vacuna o tiene programado recibirla. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios con animales han mostrado que RINVOQ puede causar daño al feto. Antes de que usted comience a tomar RINVOQ, su proveedor de atención médica verificará si está embarazada. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y al menos durante 4 semanas después de su última dosis.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ puede pasar a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use**, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

**Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:**

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Si no está seguro de si toma alguno de estos medicamentos, pregúntele a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

### ¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ, evite consumir comidas o bebidas que contengan toronja (pomelo), ya que estas podrían aumentar el riesgo de efectos secundarios.

### ¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cualquier síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
  - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
  - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
  - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
  - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
  - Transpiración fría repentina
  - Náuseas o vómitos

- Sensación de mareo
- Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
- Habla arrastrada
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta signos o síntomas de coágulos sanguíneos; por ejemplo:
  - Hinchazón
  - Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas
  - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
  - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor de estómago que no cede y cambios en sus hábitos intestinales.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios más frecuentes se encuentran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, infecciones de los senos paranasales); culebrilla (herpes zóster); infecciones por herpes simple (como herpes labial); bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de las concentraciones sanguíneas de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal; aumento de peso; gripe; cansancio; cifras más bajas de ciertos tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia); dolor muscular; enfermedad seudogripal; sarpullido; aumento de los niveles de colesterol en la sangre y aumento de las enzimas hepáticas.

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

### ¿Cómo debo usar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ viene en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

**Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.**

**Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**

**Si tiene dificultades para pagar su medicamento, es posible que AbbVie pueda ayudar. Visite [AbbVie.com/myAbbVieAssist](http://AbbVie.com/myAbbVieAssist) para obtener más información.**

**Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para RINVOQ en [https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_SPA.pdf](https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_SPA.pdf) y hable con su médico.**